

ICHTYLOSES ET KÉRATODERMIE PALMOPLANTAIRE (groupe IPK):

Bien lire les recommandations générales.

Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les patients atteints d'ichtyoses et de kératodermie palmoplantaire.

La vaccination contre le SARS-CoV-2 est importante pour l'ensemble de la population, y compris pour les patients atteints d'ichtyoses et de kératodermie palmoplantaire. C'est un choix qui relève du patient, comme de tout autre citoyen.

Cependant, pour les patients atteints des formes sévères d'ichtyose ou de kératodermie palmoplantaire, la vaccination pourrait être fortement recommandée, notamment pour les patients présentant un état général dégradé (dénutrition par exemple), une importante fragilité muqueuse et cutanée. Ces situations peuvent être évaluées au cas par cas avec le médecin référent du centre de référence qui suit le patient.

Pour les patients qui ont présenté et/ou présentent un terrain allergique important comme les patients atteints de Syndrome de Netherton, la vaccination est au mieux à réaliser en milieu hospitalier. En cas d'antécédents anaphylactiques sévères elle reste aujourd'hui à réfléchir avec prudence, au cas par cas avec le médecin référent expert, jusqu'à plus d'information.

Pour plus de détails et en cas de questionnement d'un patient, n'hésitez pas à contacter le spécialiste qui assure son suivi médical, par courriel, fax ou téléphone.