

**TUMEURS VASCULAIRES, MALFORMATIONS VASCULAIRES, HÉMANGIOMES, NAEVUS CONGÉNITAUX,
TROUBLES PIGMENTAIRES :**

Bien lire les recommandations générales.



Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les patients atteints de mosaïcisme cutané ou de malformations vasculaires ou lymphatiques.

La vaccination contre le SARS-CoV-2 est importante pour l'ensemble de la population, y compris pour les patients atteints de ces maladies. C'est un choix qui relève du patient, comme de tout autre citoyen.

Toutefois, pour les patients atteints des formes sévères (état général dégradé, atteinte d'un organe comme le poumon ou le coeur), la vaccination pourrait être fortement recommandée. Ces situations peuvent être évaluées au cas par cas avec le médecin référent du centre de référence qui suit le patient.

Certains patients reçoivent des médicaments qui ont des propriétés immunosuppressives. Compte tenu de l'effet des immunosuppresseurs sur l'efficacité de la vaccination, l'immunosuppression au moment de la vaccination doit être aussi faible que possible. Toutefois, si un traitement immunosuppresseur a été débuté et est essentiel pour le patient, il ne doit pas être arrêté dans le but de potentiellement améliorer l'efficacité de la vaccination.

Si un tel traitement n'a pas encore été introduit et s'avère nécessaire, il est préférable de vacciner avant son introduction le patient. En cas de doute, veuillez discuter des meilleures modalités possibles avec le médecin expert qui suit le patient.

Pour plus de détails et en cas de questionnement d'un patient, n'hésitez jamais à contacter le spécialiste qui assure son suivi médical, par courriel, fax ou téléphone.